

УДК 616.516-08

СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ

И.П.Иванова, О.Н.Чепурняк, М.Д.Давлеева

Донецкий национальный медицинский университет им. М.Горького

Целью нашей работы заключалось в оценке клинических проявлений течения и терапии красного плоского лишая (КПЛ) слизистых оболочек полости рта (СОПР). Обследовано 65 пациентов с диагнозом «красный плоский лишай». Из них 15,5% - мужчины и 84,5% женщины. Все больные прошли обследование: анализы крови, мочи; по показаниям – биохимические и иммунологические исследования крови; микроскопию и биопсию участков кожи и слизистых, консультацию стоматолога. Первичных больных - 25%, вторичных 40% и 35%- с распространенной формой КПЛ с вовлечением в процесс СОПР. Острое течение у 55%, у остальных - подострое. Все больные проходили амбулаторное лечение. Лечение больных носило комплексный характер. Все больные получали кортикостероиды (дипропан, дексаметазон, преднизолон), в сочетании с производными 4-аминохинолина (плаквенил). Использовались средства десенсибилизирующей терапии – антигистаминные препараты (супрастин, тавегил, диазолин), донаторы сульфгидрильных групп (тиосульфат натрия); препараты никотиновой кислоты; ферментные (фестал, энзистал) и адсорбирующие средства (сорбекс); витаминные препараты. При присоединении кандидозной флоры однократно назначали флуконазол. Из местных препаратов применяли мази с кортикостероидами и кератопластики, орошения 2% раствором лидокаина, полоскания 0,05% р-ром хлоргексидина. Таким образом, в результате проведенного лечения мы добились регресса патологических проявлений. При проведении терапии КПЛ на слизистых оболочках полости рта учитывались формы заболевания, и их осложнения.