

## СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА В ЛЕЧЕНИИ ПСОРИАЗА И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

К.А.Веретельник

Псориазная болезнь – одна из актуальнейших медико-социальных проблем современной дерматологии, так как около 80% млн. человек на земном шаре страдает этим дерматозом. Под наблюдением находились 36 больных псориазной болезнью, которые были поделены на 2 группы по 18 человек. Мужчины и женщины в каждой из групп составляли 60% и 40% соответственно. Возраст пациентов варьировал от 20 до 55 лет. Давность заболевания – от 5 до 20 лет. Всем пациентам проводили клиничко-лабораторный мониторинг с определением общеклинических показателей и PASI в динамике терапии. Пациенты первой группы получали стандартную и топическую терапию. Курс топического лечения длился в течение 4 недель. Пациенты второй группы получали тот же объём лечения, но с использованием эомолентов дважды в сутки. Недельный срок наблюдения позволил отметить положительную клиническую динамику в обеих исследуемых группах: явления гиперемии и шелушения уменьшились на 70%, индекс PASI – на 34%. Но у пациентов второй группы практически исчезли кожный зуд и дискомфорт в очагах эффоресценций. К окончанию курса лечения индекс PASI снизился в обеих группах на 72%. Явления незначительной гиперемии и шелушения удерживались в первой группе, во второй – практически полностью регрессировали. Метод топической терапии больных псориазной болезнью с использованием эомолентов характеризуется высокой клинической эффорективностью, комплаентностью, безопасностью, осуществим и доступен в амбулаторных условиях.