

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ РУБЦОВЫХ АЛОПЕЦИЙ

А.А.Луцан

Одной из наиболее актуальных проблем современной дерматологии являются рубцовые алопеции, поскольку их возникновение значительным образом влияют на качество жизни пациентов. Целью исследования была разработка клинически обоснованных критериев дифференциальной диагностики рубцовых алопеций. Под нашим наблюдением находилось 35 больных рубцовыми алопециями: 7 пациентов с псевдопелладой Брока, 9 – с синдромом Литтла-Лассюэра, 9 – с красной волчанкой, 10 – с красным плоским лишаем. Всем больным проводились общеклинические обследования, трихосканирование и микроскопия волос в перирубцовых зонах. Установлены основные клинико-диагностические критерии разных видов рубцовых алопеций – псевдопеллады Брока, синдрома Литтла-Лассюэра, алопеций, обусловленных красным плоским лишаем, красной волчанкой. Среди них основными признаны: наличие типичных высыпаний вне волосистой части головы, локализация патологических очагов и их форма, симметричность, первичные морфологические элементы сыпи, их окраска, наличие или отсутствие раздвоенных волос. Очаги рубцовой алопеции могут иметь различные этиологические особенности и требуют проведения тщательной дифференциальной диагностики. 2. Для дифференциальной диагностики разновидностей рубцовой алопеции помимо клинического осмотра необходимо проведение микроскопии волос в перичаговых зонах.