

ФАКТОРИ ГІГІЄНИ, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПІОДЕРМІЙ

І.О.Чаплик-Чижо, М.О.Дашко, І.Д.Бабак, О.А.Білінська

Піодермії об'єднують в собі гнійно-запальні шкірні захворювання, причиною яких є гноєтворні мікрофлора – піококи, стафілококи і стрептококи. В економічно розвинених країнах хворі на піодермії становлять 1/3 серед пацієнтів, які страждають інфекційними захворюваннями. У дитячому віці захворюваність вища, ніж у дорослих, і складає 25-60% від загального числа захворювань дерматозами у цьому віці. Метою роботи було з'ясування необхідності та ефективності застосування миючих засобів по догляду за шкірою (мила, гелі та ін.) та визначити ступінь сангігієнічної обізнаності пацієнтів з піодерміями. Нами було проведено анкетування 64 хворих на піодермії, з них 30 батьків дітей. Усім пацієнтам у план обстеження було включено бактеріологічний посів з вогнищ уражень. При обробці даних ми отримали наступні результати: 8 (13%) пацієнтів застосовували миючі засоби до 4 раз на день, 15 (23%) пацієнтів від 4 до 8 раз на день, 41 (64%) - більше 8 раз на добу, що найчастіше було пов'язано з професійною діяльністю, педантичністю, страхом інфікування. 51 (80%) хворих застосовували для догляду засоби, що мають антибактерійний компонент. 45 хворих (70%) вмивали все тіло антибактерійними миючими засобами щодня. У 21 (32%) пацієнтів при бакпосіві виявлено стрептококи, у 25 (39%) хворих - стафілококи, у 18 (29%) пацієнтів діагностована мікст інфекція (стрептококи, стафілококи, кандиди, ін.). Отже, часте миття тіла з використанням миючих засобів по догляду за шкірою з антибактерійним ефектом сприяє виникненню дисбіозу шкіри, що є провокуючим фактором розвитку піодермії. Тому практичним лікарям дерматовенерологам слід приділяти цьому фактору належну увагу та проводити профілактичні бесіди як з хворими на піодермії, так і здоровими людьми з призначенням засобів догляду за тілом без антибактерійного ефекту.